



**ЗАДАЦИ ЗА РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ (2009.)**  
**I РАЗРЕД**

1. Аутомобил се креће из града А према граду Б. Трећину пута прелази средњом брзином  $v_1=100 \text{ km/h}$ , шестину средњом брзином  $v_2=80 \text{ km/h}$ , а остатак средњом брзином  $v_3=120 \text{ km/h}$ . Одредите средњу брзину аутомобила на цијелом путу.


2. Под дејством сile  $F$  (слика) тијело се креће равномјерно уз глатки вертикални зид. Колика је маса тијела? Колика је сила реакције подлоге?




3. Дат је механички систем као на слици. Канап којим су повезана тијела занемарљиво мале масе, идеално савитљив, неистегљив и клизи без трења преко котура. Kad се систем препусти сам себи и претпостави да се у тренутку удара тежег тијела о Земљу лакше тијело одваја од канапа. Одредити до које висине ће се попети лакше тијело.



4. Наћи силу затезања нити  $T$  и силу  $F$  којом куглица масе  $10 \text{ g}$  дјелује на глатку стрму раван приказану на слици, ако је угао  $\alpha=30^\circ$ . Узети да је  $g=10 \text{ m/s}^2$ .



5. Отворени суд масе  $m=2 \text{ kg}$  чврсто пријања уз подлогу и не пропушта воду (види слику). Познато је да је  $D=2d$  и  $d=5 \text{ cm}$ . У суд се налива вода. Суд ће почети да се подиже када ниво воде у суду достигне висину  $h$ . Одреди висину  $h$ . Густина воде је  $1000 \text{ kg/m}^3$ .



## РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА ЗА I RAZRED

1.

$$v_1=100 \text{ km/h}, v_2=80 \text{ km/h}, v_3=120 \text{ km/h}, v_s=?$$

Вријеме које аутомобил проведе на трећини пута  $t_1 = \frac{s/3}{v_1} = \frac{s}{3v_1}$  [3] с – укупна дужина пута. На


шестину пута тијело проведе вријеме  $t_2 = \frac{s/6}{v_2} = \frac{s}{6v_2}$  [3] а на преосталом дијелу пута

$$t_3 = \frac{(s - \frac{s}{3} - \frac{s}{6})}{v_3} = \frac{s}{2v_3} \quad [3] \quad \text{средња брзина на умјереном путу } v_s = \frac{s}{t_1 + t_2 + t_3}$$

$$v_s = \frac{s}{\frac{s}{3v_1} + \frac{s}{6v_2} + \frac{s}{2v_3}} \quad [2] \quad v_s = \frac{6v_1 v_2 v_3}{2v_2 v_3 + v_1 v_3 + 3v_1 v_2} \quad [5] \quad v \approx 104 \frac{\text{km}}{\text{h}} \quad [4]$$

$\Sigma=20$

2.



$F_1$  и  $F_2$  су хоризонтална и вертикална компонента сile  $F$

Како се тијело уз зид креће равномјерно то је убрзање једнако нула, па је

$$mg - F_2 = 0 \quad [4] \quad F_2 = F \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} F \quad [2]$$


$$mg = \frac{\sqrt{2}}{2} F \quad [6] \quad m = \frac{\sqrt{2}F}{2g} \quad [4]$$

Тијело се по хоризонтали не креће па је  $N = F_1$  [6]

$$N = F \cos 45^\circ = F \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \quad [4]$$

$\Sigma=20$

3.



Силе које дјелују на тијела током кретања већег тијела наниже

$$3mg - T = 3ma \quad (1) \quad [3] \quad T - mg = ma \quad (2) \quad [3]$$

Сабирањем (1) и (2) добијамо убрзање тегова

$$2mg = 4ma \quad a = \frac{g}{2} \quad [2]$$

Брзина коју ће имати већи тег при удару о Земљу је

$$v^2 = 2ah \quad [2] \quad v = \sqrt{2ah} \quad v = \sqrt{2 \cdot \frac{g}{2} h} \quad v = \sqrt{gh} \quad [2]$$


У моменту удара већег тијела о земљу мањи тег је на висини  $h$  и има исту брзину  $v = \sqrt{gh}$ . Од тог момента кретање мањег тијела се може посматрати као вертикални хитац са почетном брзином  $v_0 = \sqrt{gh}$  пут који прелази до застувљања је  $v^2 = v_0^2 - 2g\Delta h$

$$0 = v_0^2 - 2g\Delta h \quad [2] \quad \Delta h = \frac{v_0^2}{2g} \quad \Delta h = \frac{(\sqrt{gh})^2}{2g} = \frac{gh}{2g} \quad [2] \quad \Delta h = \frac{h}{2} = 2m \quad [2]$$

А његова висина изнад земље је  $H = h + \Delta h = 4m + 2m = 6m \quad [2]$

$\Sigma=20$

4.



$$m=10g, \alpha=30^\circ, g=10m/s^2, T=? F=?$$


Силе које дјелују на куглицу су  $T$ -сила затезања нити  $N$ -сила реакције подлоге (дјелује у правцу нормале на стрму раван)  $N=F$

$mg$  – тежина куглице

Збир сила дуж  $x$  и  $y$  осе мора бити једнак нули

$$N \sin \alpha - T \sin \alpha = 0 \quad [5] \quad (1)$$

$$T \cos \alpha + N \cos \alpha - mg = 0 \quad [5] \quad (2)$$



$$(1) N \sin \alpha = T \sin \alpha \Rightarrow N = T \quad [3]$$

$$T \cos \alpha + T \cos \alpha = mg$$

$$2T \cos \alpha = mg$$

$$T = \frac{mg}{2 \cos \alpha} \quad [3] \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$T = \frac{0.01kg \cdot 10 \frac{m}{s^2}}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$T = \frac{0.1N}{\sqrt{3}}$$

$$N = T = 5,8 \cdot 10^{-2} N$$

$$\Sigma = 20$$

II начин

Ако се у оса постави у правцу нормале на стрму раван а  $x$  оса у правцу косине стрме равни, једначине (1) и (2) тада постају

$$T \cos \alpha - mg \sin \alpha = 0 \quad (1) \quad N + T \sin \alpha = mg \cos \alpha \quad (2)$$

Из (1) следи  $T = mg \tan \alpha$  и уврштавањем у (2) добија се  $N = mg \frac{\cos 2\alpha}{\cos \alpha}$  (за  $\alpha=30^\circ$  изрази за  $T$  и

$$N$$
 се своде на претходно добијене изразе)  $T = 5,8 \cdot 10^{-2} N \quad N = 5,8 \cdot 10^{-2} N$

5.

$$m=2kg, D=2d, d=5cm, h=?$$

Сила којом контејнер притиска подлогу у вертикалном правцу  $F_1$  једнака је збиру сила

$$\text{тежине контејнера } Q \text{ и силе атмосферног притиска } F = P_a \cdot S = P_a \cdot \frac{(D^2 - d^2)\pi}{4} \quad [3]$$

$$F_1 = Q + P_a \frac{(D^2 - d^2)\pi}{4} \quad [3]$$

$$\text{Сила којом вода дјелује на контејнер вертилано увис једнака је } F_2 = (P_a + \rho gh) \frac{(D^2 - d^2)\pi}{4} \quad [3]$$

Контејнер ће почети да се подиже када се испути услов  $F_1 = F_2$   $[3]$

$$Q + P_a \frac{(D^2 - d^2)\pi}{4} = (P_a + \rho gh) \frac{(D^2 - d^2)\pi}{4} \quad [2] \quad Q = mg$$

$$\text{Одатле, } h = \frac{4m}{\rho(D^2 - d^2)\pi} \quad [4] \quad h \approx 34cm \quad [2] \quad \Sigma = 20$$